Mode d'emploi du médicament EFFERALGAN

Dans quel cas le médicament EFFERALGAN est-il prescrit ?

Ce médicament est un antalgique et un antipyrétique qui contient du paracétamol.
Il est utilisé pour faire baisser la fièvre et dans le traitement des affections douloureuses.
Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- Arthrose et rhumatismes
- Douleur chez l'enfant
- Fièvre de l'adulte
- Fièvre de l'enfant
- Maux de tête et migraine
- Prise en charge de la douleur

Présentations du médicament EFFERALGAN
EFFERALGAN 500 mg : comprimé (blanc) ; boîte de 16
EFFERALGAN 500 mg : comprimé effervescent sécable (blanc) ; boîte de 16
EFFERALGAN 1 g : comprimé effervescent ; boîte de 8

Composition du médicament EFFERALGAN

	p cp	p cp efferv	p cp efferv
Paracétamol	500 mg	500 mg	1 g
Sodium		412,4 mg	548 mg
Sorbitol		+	+
Potassium			29,20 mg

Substance active : Paracétamol
Excipient commun : Povidone
Autres excipients (spécifiques à certaines formes) : Acide citrique, Acide citrique anhydre, Alpha-terpinéol, Aspartam, Bicarbonate de sodium, Carthame extrait, Cellulose microcristalline, Croscarmellose sel de Na, Docusate sodique, Gamma-terpinène, Glycérol béhénate, Gomme arabique, Hypromellose, Jus concentré d'orange, Linalol, Magnésium stéarate, Maltodextrine, Orange essence, Orange-pamplemousse arôme, Pamplemousse essence, Pamplemousse isolat, Potassium acésulfame, Saccharine sodique, Sodium, Sodium benzoate, Sodium carbonate anhydre, Sorbitol, Terpènes d'orange

Contre-indications du médicament EFFERALGAN

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de maladie grave du foie.
Attention Le paracétamol est présent seul ou en association avec d'autres substances dans de nombreux médicaments : assurez-vous de ne pas prendre simultanément plusieurs médicaments contenant du paracétamol, car une prise conjointe entraîne un risque de surdosage qui peut être toxique pour le foie.

Interactions du médicament EFFERALGAN avec d'autres substances

En cas de traitement par un anticoagulant oral et par du paracétamol aux doses maximales (4 g par jour) pendant au moins 4 jours, une surveillance accrue du traitement anticoagulant sera éventuellement nécessaire.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :
Les études scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation du paracétamol chez la femme enceinte.
Allaitement :

Aux doses usuelles, l'usage de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament EFFERALGAN

Ce médicament peut être pris indifféremment pendant ou entre les repas, en respectant un intervalle de 4 à 6 heures entre 2 prises. En cas d'insuffisance rénale, l'intervalle entre 2 prises doit être au minimum de 8 heures.

Les comprimés effervescents sécables à 500 mg sont destinés à l'adulte et à l'enfant de plus de 13 kg.

Les comprimés à 500 mg sont destinés à l'adulte et à l'enfant de plus de 27 kg.

Les comprimés effervescents à 1 g sont destinés à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg.

Posologie usuelle :

- Adulte et enfant de plus de 50 kg : 500 mg à 1 g, 1 à 3 fois par jour. Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour sans avis médical.
  Dans les douleurs sévères de l'adulte et notamment dans l'arthrose, la posologie maximale peut être portée à 1 g de paracétamol, 4 fois par jour, uniquement sur prescription médicale.
- Enfant : 60 mg par kg et par jour, soit 15 mg par kg toutes les 6 heures, ou 10 mg par kg toutes les 4 heures. Il est nécessaire de choisir une présentation adaptée et de suivre les recommandations de votre pharmacien ou de votre médecin. Les posologies suivantes sont données à titre indicatif :
  - Enfant de 13 à 20 kg (environ de 2 à 7 ans) : 1/2 comprimé effervescent à 500 mg, 1 à 4 fois par jour ;
  - Enfant de 21 à 26 kg (environ de 6 à 10 ans) : 1/2 comprimé effervescent à 500 mg, 1 à 6 fois par jour ;
  - Enfant de 27 à 40 kg (environ de 8 à 13 ans) : 1 comprimé à 500 mg (effervescent ou non), 1 à 4 fois par jour.
  - Enfant de 41 à 50 kg (environ de 12 à 15 ans) : 1 compirmé à 500 mg (effervescent ou non), 1 à 6 fois par jour.

  La dose quotidienne maximale de paracétamol chez l'enfant est de 80 mg par kg, en 4 prises minimum, sans dépasser 3 g par jour.
-

Conseils

Dans le traitement de la fièvre chez l'enfant, lorsque le paracétamol est utilisé à la dose de 60 mg par kg et par jour, l'adjonction d'aspirine ou son usage en alternance avec le paracétamol est inutile, car l'aspirine ne permet pas d'obtenir une baisse supplémentaire de la fièvre.

Des sueurs abondantes accompagnent généralement la baisse de température lors du traitement des fièvres élevées. Ce phénomène est normal.

Les comprimés effervescents doivent être conservés à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.